

V Praze dne 26.04.2011

Program prevence rakoviny děložního čípku a dalších HPV onemocnění

Vážené kolegyně, milé dámy,

obracím se na Vás s jedinečnou nabídkou účasti v preventivním programu České asociace sester, který je zaměřen na prevenci rakoviny děložního čípku a dalších HPV onemocnění.

V České republice každý rok onemocní rakovinou děložního čípku 1000 žen a 400 z nich této nemoci podlehnou. Jedná se přitom o první nádorové onemocnění, proti němuž existuje vakcína.

Očkování je vhodné pro všechny dívky a ženy ve věku od **9 do 45 let** (dle SPC vakcíny Silgard), jelikož v průběhu života ženy může dojít k opakovanému infikování HPV.

Abychom zvýšili dostupnost očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, připravili jsme pro Vás preventivní program, který nabízíme se slevou pouze pro členky ČAS.

Tento preventivní program probíhá od **26.4. do 30.6. (aplikace první dávky)** a je určen pro členky České asociace sester a jejich rodinné příslušníky - ženy a dívky ve věku od **9 do 45 let**. Cena za 3 dávky vakcíny, potřebné pro kompletní očkování, která se na volném trhu pohybuje okolo **11 000 Kč**, by byla pro Vás a Vaše rodinné příslušníky v rámci tohoto programu **6 626 Kč**. Členky České asociace sester a jejich rodinní příslušníci ve věku do 25 let mohou zároveň využít i výhody programů zdravotních pojišťoven "Třetí dávka zdarma" (příspěvek na očkování ze strany zdravotní pojišťovny).

Máte-li zájem se preventivního programu zúčastnit, vyplňte prosím a vytiskněte si přiložený VOUCHER a postupujte dle instrukcí, které jsou na voucheru uvedeny.

Věřím, že tímto jedinečným programem přispějeme k zdraví Vašemu a Vašich blízkých,

Se srdečným pozdravem

podpis

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
prezidentka České asociace sester

O HPV onemocněních

Rakovina děložního čípku vzniká průměrně za 15 let od infekce vysoce rizikovými typy HPV. Zpočátku probíhá bez příznaků. Pravidelné gynekologické prohlídky umožňují odhalit nemoc již v počátečním stadiu, kdy je možné zahájit včasnou a účinnou léčbu.

Karcinom děložního čípku ale není jediné onemocnění, které má souvislost s HPV infekcí. Lidské papilomaviry napadají různá místa na těle mužů i žen a u obou pohlaví mohou vést k rozvoji závažných onemocnění. U žen HPV způsobuje léze a karcinomy děložního čípku, **zevních rodidel** a **pochvy**. U mužů vede HPV infekce k rozvoji análního karcinomu a rakoviny penisu. U obou pohlaví je HPV zodpovědné za výskyt **genitálních**

bradavic a papilomů v dýchacích cestách. HPV infekce má také souvislost s některými případy rakoviny hlavy a krku.

HPV se přenáší především pohlavním stykem nebo přenosem z rukou či úst na pohlavní orgány. K přenosu tedy může dojít i při nekoitálních aktivitách a ani kondom není dokonalou ochranou. Infekce HPV viry probíhá velmi často zcela bez příznaků. Navíc ve většině případů sama odezní. K rozvoji onemocnění dochází jen v menšině případů. Kvůli těmto vlastnostem se však virus velmi snadno šíří – v současné době je **HPV nejčastější pohlavně přenosnou infekcí**, kterou během života získá přibližně 70 % populace.

Více o HPV onemocněních se dozvíte na webových stránkách **www.hpv-college.cz**.