

Doporučené materiály k ošetření ran u novorozenců

*Vychází z pracovního jednání ranhojiček
z neonatologických oddělení v ČR*

V Praze dne 1. 10. 2015

Nekrotická rána

Spodina: černá / hnědá

Sekrece: žádná / malá

Okolí: klidné / erytém



Cíl: odstranění nekrotické tkáně

Návrhy prostředků vlhkého hojení:

Oplach: FR, Prontosan, Octenisept, Dermacyn, Aqvitox-D

Primární krytí:

Hydrogel: Nu-gel, Granugel, Suprasorb G, Flaminal Hydro, Hemagel, Askina gel, Hydrosorb, Hydrosob gel, Suprasorb X

Hydrokoloid: Granuflex, Askina Hydro, Suprasorb H

Fixace hydrogelu:

Neadherentní mřížka: Adaptic, Atrauman, Grassolind

Filmový obvaz: Tegaderm Film, Askina Derm, Mepitel Film, Hydrofilm

Výměna krytí: 24-72h

Povleklá rána

Spodina: žlutá

Sekrece: žádná / malá

Okolí: klidné / erytém



Cíl: odstranění povlaků, prevence infekce

Návrhy prostředků vlhkého hojení:

Oplach: Prontosan, Octenisept, Dermacyn, Aqvitox-D

Primární krytí:

Hydrogel: Nu-gel, Flaminal Hydro, Prontosan gel, Hemagel, Askina gel, Hydrosob gel

Hydrofiber: Aquacel, Aquacel Ag

Obvazy s aktivním uhlím, stříbrem: Actisorb Plus 25

Sekundární krytí:

Filmový obvaz: Tegaderm Film, Askina Derm, Mepitel Film, Hydrofilm

Výměna krytí: 24- 72h

Infikovaná rána

Spodina: žlutá / červená

Sekrece: silná / střední

Okolí: otok, erytém/ macerace



Cíl: snížení množství bakterií, zvládnání sekrece

Návrhy prostředků vlhkého hojení:

Oplach: Octenisept, Betadine, Prontosan

Primární krytí:

Krytí se stříbrem: Aquacel Ag, Actisorb Plus25, Carboflex, Mepilex

Transfer Ag, Calgitrol pasta, Askina Carbosorb

Antiseptické krytí: Bactigras, Inadine, Cutimed Sorbact gel

Sekundární krytí:

Absorbční krytí: Mulové čtverce, Askina Absorb, Zetuvit,

Filmový obvaz: Tegaderm Film, Askina Derm, Mepitel Film, Hydrofilm

Výměna krytí: 12-24h

Granulující rána

Spodina: červená

Sekrece: žádná / malá

Okolí: klidné



Cíl: udržení vlhkosti, podpora granulace

Návrhy prostředků vlhkého hojení:

Oplach: FR, Prontosan

Primární krytí:

Hydrokoloid: Granuflex, Granuflex Extra Thin, Suprasorb H

Neadhezivní mřížka: Adaptic (+fixace Tegaderm)

Pěnové krytí: Mepilex Lite, Mepilex, Askina DresSil

Výměna krytí: 24- 48

Epitelizující rána

Spodina: růžová

Okolí: klidné



Cíl: udržení vlhkosti, ochrana před poškozením

Návrhy prostředků vlhkého hojení:

Primární krytí:

Hydrokoloid: Granuflex extra Thin, Askina Biofilm,

Neadhezivní krytí: Adaptic, Bactigras, Mepitel, Mepilex Lite

Přípravek obsahující kyselinu hyaluronovou: Hyiodine, Bionect

Výměna krytí: 48 – 72h

Návrhy materiálů k ošetření dalších typů poškození kůže u novorozence:

Exkoriace, eroze: Granuflex Extra Thin, Askina Hydro, Bionect krém, Adaptic, Stomahezive zásyp, Flamigel, Bactigras, Mepilex Lite, Hemagel

Ragády: Cicatridina ung, Leniens ung

Plenková dermatitida:

Prevence: Askina Barrier cream/film, Secura spray

Cavilon spray/cream, Menalind krém, Sudocrem, Šmírové mýdlo (spir. saponis kalini)

Léčba: Imazol, Hemagel

Oplachy: černý čaj, odvar řepíku lékařského

Zapáčky, macerace: větrat, Mepilex Transfer, Bactigras

Oplachy: Prontosan, černý čaj, slabý roztok hypermanganu

Operační rány: Folie, Mepilex Lite, Mepilex Border post op